

AminoBore



Nutrition et
Correcteur de carence

www.fertinagro.com





Engrais NF U 42-003-2. Utilisable en Agriculture Biologique. Bore 108 g/l

- Formulation innovante de nutriments.
- Produit liquide, facile et rapide à diluer dans l'eau, permet une pulvérisation homogène.
- Concentration élevée en bore soluble eau (9%) sous forme éthanolamine.
- Apport d'énergie immédiat pour les plantes en période de stress.

AMINOBORE favorise :

- L'absorption foliaire et la mobilisation du bore dans la plante.
- La récupération des cultures fragilisées par des conditions difficiles (froid, gelées...).
- La migration des glucides et des produits de la photosynthèse vers les fruits.
- L'activation générale de la croissance des cultures.

Avantages agronomiques

- Augmente la fécondation des fleurs.
- Nouaison et grossissement optimum des baies et des fruits.
- Préviend la coulure sur les grappes.
- Correction rapide des carences en bore.
- Correction des chloroses et du rachitisme avec des entre noeuds courts et épais.
- Diminution de la chute des feuilles (« balai de sorcière » sur olivier) et des fruits.
- Meilleure translocation du calcium entre les tissus.
- Meilleure résistance des cultures lors des périodes critiques.
- Amélioration de la qualité à la récolte (moins de fruits déformés).

Teneurs déclarées % p/p

Azote (N) total	4
dont Azote (N) organique	4
Bore (B) soluble dans l'eau	9

Autres caractéristiques

pH	7
----	---

Sensibilité des cultures à un manque de bore (d'après A. Loué)

Sensibles	Moyennement sensibles
Betterave	Agrumes
Brocoli	Bananier
Carotte	Chou
Céleri	Epinard
Chou-fleur	Laitue
Colza	Lin
Coton	Maïs
Luzerne	Orange
Oeillet	Pêcher
Olivier	Poirier
Orge	Pomme de terre
Pommier	Radis
Rosier	Tabac
Tournesol	Tomate
Vigne	Trèfle

Application recommandée par culture*

Culture	Période d'application	Pulvérisation foliaire
Betterave	Stade : 8 à 12 feuilles	2 à 3 L/ha
Tournesol	Stade : 4 à 8 feuilles	2 à 3 L/ha
Luzerne	8 à 12 jours après chaque coupe	2 à 3 L/ha
Colza	Rosette à montaison	2 à 3 L/ha

Culture	Période d'application	Application au sol
Toute	Début de cycle	4 à 5 applications et jusqu'à 10 à 20 L/ha

*Les dosages applicables sont donnés à titre indicatif. Pour plus de précisions, consulter notre service technique.

Précautions

Ne pas mélanger avec des produits très alcalins, soufres, cuivres, huiles minérales. Agiter avant utilisation.

Conditionnement

- Bidons de 20 L
- Cuve 1000 L